

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Βλαστικά στάδια: Η καρπόδεση στις πρώτες ποικιλίες έχει ολοκληρωθεί και οι νεαροί καρποί έχουν μέγεθος 3-4 χιλ.

		
Ανεπτυγμένη προνύμφη του <i>Pammene fasciana</i> .	Νεαροί καρποί (κύπελλα) μεγέθους 2-4 χιλ., κατάλληλο στάδιο για ψεκασμό.	Αποχωρήματα της προνύμφης σε νεαρό καρπό (κύπελλο).

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Δελτίο Νο 1.

ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ
ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ:
(*Pammene fasciana*)

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Τρόπος επέμβασης:

- Είναι μια μικρή νυχτόβια πεταλούδα. Η προνύμφη της προσβάλλει νεαρούς καρπούς λίγο μετά την καρπόδεση (μέγεθος καρπού 3 - 5 χιλ.).
- Οι νεαροί προσβεβλημένοι καρποί (κύπελλα) πέφτουν πρόωρα (Ιούλιο - Αύγουστο) προκαλώντας ζημιές με οικονομική σημασία κυρίως σε καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.

- Στο δίκτυο παρακολούθησης του εντόμου με φερομόνες φύλου καταγράφονται μεγάλοι πληθυσμοί και οι πρώτες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο.

Συνιστάται ένας ψεκασμός κάλυψης:

- **Πρώτες ποικιλίες: 26 - 30 Ιουνίου**
- **Όψιμες ποικιλίες:** αμέσως μετά την καρπόδεση και μέχρι οι νεαροί καρποί (κύπελλα) να αποκτήσουν μέγεθος 3 - 5 χιλιοστά.

Ανάγκη προστασίας έχουν μόνο οι καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.

Η επέμβαση πρέπει να γίνεται επιμελημένη και κατευθυνόμενη στους νεαρούς καρπούς με καλή κάλυψη με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Εγκεκριμένα σκευάσματα για Λεπιδόπτερα στην καλλιέργεια της καστανιάς

Δραστική ουσία	Εμπορικό όνομα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες)
phosmet	<i>Imidan 50 WG</i>	1 - 2	7
lambda cyhalothrin	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	1 - 2	14
chlorantraniliprole	<i>Coragen 20 SC</i>	2	21
deltamethrin	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	1 - 2	30

Το Τεχνικό Δελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της ΔΑΟΚ Χανίων και την "Αναπτυξιακή Εννιά Χωριών".

Ηράκλειο 22 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα