

# Βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε το νέο εχθρό της καστανιάς

## Η σφήκα της καστανιάς *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*

Προσβάλλει τα διάφορα είδη της καστανιάς και προκαλεί μείωση της παραγωγής κάστανων (60-85%)



### Πως μοιάζει η προσβολή:

Χαρακτηριστικές κηκίδες που δημιουργεί το έντομο κατά το τέλος της άνοιξης και τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι την έξοδο των ενηλίκων (1η και 2η) και νωρίς την άνοιξη (3η).

**Αποφυγή μεταφοράς του εντόμου με τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τα μολυσμένα δενδρύλλια/εμβόλια.**



Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου δείγματος άμεση επικοινωνία με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για τις καλλιεργούμενες καστανιές και Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων για τις καστανιές σε δάση και δασικές εκτάσεις, και στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας Σ.Κ.Δ., τηλ.: 1591).



Υπουργείο  
Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
και Προστασίας Δασών  
και Αγροπεριβάλλοντος  
Διεύθυνση Προστασίας Δασών  
και Αγροπεριβάλλοντος  
[www.ypeka.gr](http://www.ypeka.gr)



Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης  
Φυτικής Παραγωγής  
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής  
Παραγωγής  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)



ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ  
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής  
Ζωολογίας  
Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας  
[www.bpi.gr](http://www.bpi.gr)



ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  
Εργαστήριο Δασικής  
Εντομολογίας  
[www.fri.gr](http://www.fri.gr)