

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Βλαστικά στάδια αμπελιού



Στάδιο C

Πράσινη κορυφή



Στάδιο D

Έξοδος φύλλων



Στάδιο E

Δεύτερο φύλλο ξεδιπλωτό



Στάδιο F

Εμφάνιση σταφυλιών



Ωίδιο. Καστανές κηλίδες σε
περσινές κληματίδες.



Ωίδιο. Μολυσμένος βλαστός
(πρώιμη προσβολή).



Φόμοψη. Προσβολή σε νεαρό
βλαστό και σε φύλλο.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Το άνοιγμα των ματιών σταδιακά ξεκίνησε στις προωμότερες περιοχές. Οι πρώτες επεμβάσεις στα αμπέλια σχετίζονται με συγκεκριμένα βλαστικά στάδια.

<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>) (χολέρα, σίρικας)</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>- Οι έντονες προσβολές της περασμένης χρονιάς έχουν αποτυπωθεί στις περσινές κληματίδες με τη μορφή εκτεταμένων καστανών κηλίδων που υπενθυμίζουν την ύπαρξη της ασθένειας.</p> <p>- Τα μολύσματα βρίσκονται ήδη μέσα στα μάτια και θα προσβάλλουν τη νέα βλάστηση από το ξεκίνημα της.</p> <p>Υποχρεωτική αντιμετώπιση της ασθένειας σε όλα τα αμπέλια όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκ. (στάδια E - F).</p> <p>Σε αμπέλια που ευνοείται η ασθένεια ή υπάρχουν τα σημάδια στις κληματίδες η αντιμετώπιση να είναι συστηματική.</p> <p><u>Καλλιεργητικά μέτρα:</u> Ο εβδομαδιαίος έλεγχος μέχρι την άνθηση με σκοπό την αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές) περιορίζει την ασθένεια και μειώνει τους αναγκαίους ψεκασμούς.</p>
<p>ΦΟΜΟΨΗ: (<i>Phomopsis viticola</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>- Ασθένεια του ξύλου. Οι προσβεβλημένες κληματίδες είναι ξερές (κούφιας, γκριζόλευκες με μικρά μαύρα στίγματα) και τα μάτια δεν ανοίγουν.</p> <p>- Η κρίσιμη περίοδος για την ασθένεια συμπίπτει με τα πρώτα βλαστικά στάδια (πράσινη κορυφή C - έξοδος φύλλων D). Τυχόν βροχοπτώσεις την περίοδο των παραπάνω σταδίων δημιουργούν νέες προσβολές και βοηθούν στην εξαπλώση της ασθένειας.</p> <p>Τα ευαίσθητα στάδια C - D να προστατεύονται με έναν ψεκασμό που είναι καλό να γίνεται πριν από προβλεπόμενη βροχή. Αν δεν προβλέπονται βροχές να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση φόμοψης - ωιδίου.</p>
<p>ΘΡΙΠΕΣ: (<i>Thripidae</i>)</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>Οι ζημιές αφορούν τα επιτραπέζια σταφύλια λόγω της εμφάνισης εσχάρωσης στις ράγες που είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις λευκές ποικιλίες.</p> <p>Ο έλεγχος της παρουσίας τους γίνεται με αφαίρεση νεαρών βλαστών στο στάδιο D και προσεκτικό έλεγχο μέσα στα διπλωμένα φύλλα.</p> <p>Σε σταφύλια για επιτραπέζια χρήση που συνήθως εμφανίζεται ή διαπιστώνεται η παρουσία τους μετά από έλεγχο να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με το ωίδιο και τη φόμοψη.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού για το έτος 2016, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο**. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

Ηράκλειο 7 Μαρτίου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη