

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής.

15.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>) Οδηγίες:	Η δεύτερη πτήση του εντόμου έχει ξεκινήσει στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές του νομού Χανίων. Κατά τόπους καταγράφονται αυξημένες συλλήψεις και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ωστοκίες του εντόμου. Συνιστάται αντιμετώπιση το διάστημα : <ul style="list-style-type: none">• Μεσοπρώιμες περιοχές : 1 - 3 Ιουνίου• Όψιμες περιοχές : 5 - 7 Ιουνίου
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>) Συστάσεις:	Η ασθένεια εμφανίζεται στα περισσότερα αμπέλια. Να συνεχιστεί η προστασία καθώς τα βλαστικά στάδια που βρίσκεται το αμπέλι είναι ακόμα ευαίσθητα στην ασθένεια. Συνιστάται να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας. Το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης είναι πολύ αποτελεσματικό στις συνθήκες της εποχής (παρατεταμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή υγρασία). <u>Προσοχή</u> στη χρήση του σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) διότι παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)	Οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή δεν ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ανάγκη προστασίας την περίοδο αυτή έχουν αμπέλια με συμπτώματα που βρίσκονται σε θέσεις που σημειώνονται έντονες δροσιές.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)	Σε περιοχές του νομού έχει διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου. Να γίνεται αντιμετώπιση μόνο όπου εντοπίζονται προνύμφες (άπτερα άτομα) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με την ευδεμιδα.

Τα Τεχνικά Δελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έγκριση του σκευάσματος **Pyrinex 25 CS** με δραστική ουσία **chlorpyrifos** τροποποιήθηκε και το σκεύασμα επιτρέπεται στο αμπέλι μέχρι πριν την άνθηση στα επιτραπέζια και μέχρι 20 ημέρες πριν τη συγκομιδή στα οινοποιήσιμα. Παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τη λίστα που σας έχουμε αποστείλει.



Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.



Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.



Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος πολύ μικρής φακής), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι).



Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα



Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες



Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω πλευρά και λευκό χνούδι (σπόρια) μόνο στην κάτω πλευρά με υψηλή βραδινή υγρασία



Περονόσπορος. Προσβολή στο σταφύλι. Μοιάζουν με «βρασμένα χόρτα», ξεραίνονται τμήματα ή και ολόκληρα σταφύλια παίρνοντας συχνά σχήμα S (δεξιά φωτογραφία)





Τζιτζικάκι. Ενήλικο (πτερωτό) έντομο.
Είναι τα μεταναστευτικά άτομα του είδους.



Τζιτζικάκι. Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση.



Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα ποικιλίας σουλτανί.
Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Ηράκλειο 31 Μαΐου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμος Ευφροσύνη