

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον


ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)



Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.



Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.



Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος πολύ μικρής φακής), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι).



Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα



Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες



Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω πλευρά και λευκό χνούδι (σπόρια) μόνο στην κάτω πλευρά με υψηλή βραδινή υγρασία

Περονόσπορος. Προσβολή στο σταφύλι. Μοιάζουν με «βρασμένα χόρτα», ξεραίνονται τμήματα ή και ολόκληρα σταφύλια παίρνοντας συχνά σχήμα S (δεξιά φωτογραφία)



Τζιτζικάκι. Ενήλικο (πτερωτό) έντομο. Είναι τα μεταναστευτικά άτομα του είδους.

Τζιτζικάκι. Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση.

Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα ποικιλίας σουλτανί. Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ : (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Η δεύτερη πτήση του εντόμου είναι σε εξέλιξη. - Κατά τόπους καταγράφονται αυξημένες συλλήψεις και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ωτοκίες του εντόμου.</p> <p>Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρώιμες - παραλιακές περιοχές : 9 - 11 Ιουνίου • Μεσοπρώιμες περιοχές: 13 - 15 Ιουνίου <p>Σημείωση. Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.</p> <p>Συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία με εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας.</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>	<p>Παρουσιάζεται αστάθεια του καιρού με αυξημένες υγρασίες την περίοδο αυτή.</p> <p>Σε αμπέλια με συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να συνεχιστεί η προστασία και να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ : (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Η γενιά του εντόμου εξελίσσεται και οι πληθυσμοί στα αμπέλια αυξάνουν.</p> <p>Σε αμπέλια που εντοπίζονται προνύμφες (άπτερα άτομα) στην κάτω πλευρά των φύλλων μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p>

Τα Τεχνικά Δελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 8 Ιουνίου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη