

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες
(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές).



Οίδιο. Προσβολή σε ράγες, άξονες και
μίσχους σταφυλιών.



Τζιτζικάκι. Προνύμφη του
εντόμου.

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μπαγκής

23.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)

Όψιμες περιοχές ⇒

- Στις **όψιμες** περιοχές ξεκινάει η πτήση του εντόμου. Κατά την έναρξη της γενιάς οι πληθυσμοί είναι χαμηλοί και οι φωτοκίες αραίες.

Συνιστάται ψεκασμός στις **όψιμες** περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Επιτραπέζια: **18 - 19 Ιουλίου.**

Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: **21 - 23 Ιουλίου.**

- Στις **πρώιμες και ενδιάμεσες** περιοχές το διάστημα αυτό το έντομο εμφανίζει **έντονη δραστηριότητα** (αυξημένες συλλήψεις εντόμων σε παγίδες και αυξημένες φωτοκίες στα σταφύλια).

Πρώιμες περιοχές
Ενδιάμεσες περιοχές
& κάτω Μεσσαρά ⇒

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις **πρώιμες, ενδιάμεσες** περιοχές και στην **κάτω Μεσσαρά** μόνο στα οινοποιήσιμα αμπέλια και στα σταφιδάμπελα στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: **15 - 17 Ιουλίου.**

(μόνο στα οινοποιήσιμα
και στα σταφιδάμπελα)

Σημείωση. Για τα επιτραπέζια έχει δοθεί ψεκασμός σε προηγούμενο δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι προσβολές αυτής της γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρώτης) και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι και το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για τα αμπέλια του ν. Χανίων εκδίδεται ξεχωριστό δελτίο.

<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Υπενθυμίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών (λίκια) όλη τη βλαστική περίοδο και οι προσβολές τους υποβαθμίζουν τα σταφύλια για <u>επιτραπέζια</u> χρήση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στα επιτραπέζια σταφύλια να συνεχιστεί η συστηματική αντιμετώπιση. • Στα υπόλοιπα αμπέλια που βρίσκονται πριν από το γυάλισμα ή εφόσον παρουσιάζονται προσβολές μπορούν να γίνουν συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα.
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Όπου εντοπίζονται πληθυσμοί με την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται προσοχή στην καλή διαβροχή της ακραίας τρυφερής βλάστησης.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 13 Ιουλίου 2016
 Η Προϊσταμένη Τμήματος
 Κληρονόμος Ευφροσύνη