

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 20

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ




Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε πρώιμες ` περιοχές, ενδιάμεση ζώνη, κάτω Μεσσαρά.

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.


Περουόσπορος: Περίοδος με δροσιές. Ενεργοποίηση ασθένειας και προσβολές στη νέα βλάστηση.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiohini			
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών	Στάδιο Λ κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος
		Πρώιμη ζώνη		έναρξη γυαλισματος
		Μεσοπρώιμη		κλείσιμο σταφυλιών - λίγο πριν το γυάλισμα
Οψιμη ζώνη		τα σταφύλια κλείνουν		

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις πρώιμες περιοχές, στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα (συλλήψεις, φωτοκίες).
- Υπενθυμίζεται ότι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οδηγίες :

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμες περιοχές (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 18 - 20 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 20 - 22 Ιουλίου
Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 19 - 20 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 21 - 22 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.

Σημείωση. Για τις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Τα μελτέμια σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες και την αυξημένη σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών ευνοούν την ασθένεια (αύξηση μολυσμάτων, βραχύς βιολογικός κύκλος).
- Οι ρώγες πρακτικά προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
- Μετά το γυάλισμα ανάγκη προστασίας έχουν κυρίως τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται παρατεταμένες δροσιές που ενεργοποιούν εκ νέου την ασθένεια.

Οδηγίες :

Σε τοποθεσίες που εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και υπάρχει εγκατεστημένη η ασθένεια να γίνονται συνδυασμένες καταπολεμήσεις για να αποφευχθούν οι μολύνσεις στη νέα βλάστηση που θα οδηγήσουν σε πρόωρες αποφυλλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

- Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.
- Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον διαπιστώνονται 50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. **Επισημαίνεται ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχονται τα μεσοδιαστήματα μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής.**

Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα